# Rauhhautfledermaus

Pipistrellus nathusii



Die Rauhhautfledermaus ist sehr klein und einfarbig braun gefärbt, leicht zu verwechseln mit anderen Pipistrellus-Arten. Am deutlichsten am Gebiss und der Länge des fünften Fingers zu unterscheiden. Die Schwanzflughaut ist dicht behaart, die langen, dunkelbraunen Flügel haben einen helleren, unscharf abgegrenzten Saum am unteren Rand.

#### VERBREITUNG IN THÜRINGEN

- die meisten Nachweise gelingen durch Funde in Fledermauskästen
- · starke saisonale Wanderungen
- Thüringen vermutlich ein klassisches Durchzugsgebiet

#### **JAGDGEBIETE**

- · jagt entlang gradliniger Strukturen
- · auf Waldwegen, Schneisen und an Waldrändern
- · auch an Gewässern und Straßenlaternen
- · Jagdgebiet kann über 20 km² groß sein

## Rauhhautfledermaus

Pipistrellus nathusii

#### SOMMERQUARTIERE

- · überwiegend im Wald und nahe an Gewässern
- · Nachweise zu 86% in Fledermauskästen
- · bisher nur sehr wenige Wochenstubennachweise in Thüringen

#### WINTERQUARTIERE

- · legt beeindruckende Strecken zurück
- · der weiteste Überflug mit mehr als 2.000 km nachgewiesen
- · Holzstrukturen wie Baumhöhlen und Holzstapel
- · auch in Spalten von Gebäuden und Felsen

#### **BESTANDSGRÖSSE & GEFÄHRDUNG**

- · in Thüringen wurden meist einzelne Tiere gefunden
- · keine Bestandsgröße ableitbar

#### **WAS TUN?**

- · Erhalt und die Förderung von Auwäldern und Altholz
- $\cdot$  Durchzugsgebiete vor Zerschneidung bewahren
- · auf Pestizideinsätze in Wäldern verzichten

### Stiftung FLEDERMAUS

Schmidtstedter Straße 30a 99084 Erfurt

www.stiftung-fledermaus.de

Unterstützt von:



